

種別	年齢	3 か 月	6 か 月	9 か 月	1 歳	2 歳	3 歳	4 歳	5 歳	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10 歳	11 歳	12 歳	13 歳	14 歳	15 歳	16 歳	17 歳	18 歳	
ポリオ	標準 3月以上18月未満に2回	■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■	
ジフテリア 百日咳 破傷風	I 期初回DPT3回 標準 3月以上 12月未満 I 期追加DPT1回(注2) 標準 初回終了後12月以上18月未満の間 II 期DT1回 標準 11歳	■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■	
麻しん(はしか) ・風しん	I 期 1回 12月以上24月未満 II 期 1回 5歳以上7歳未満で小学校入学前の4月1日から3月31日にある者 (III期、IV期は2008年4月1日から2013年3月31日の5年間の経過措置) III期: 中学校1年生に相当する年齢の者(年度内に13歳になる者) IV期: 高校3年生に相当する年齢の者(年度内に18歳になる者)	■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■	
日本脳炎	I 期標準 初回3歳(2回) 追加4歳(1回) II 期標準 9歳(1回)	■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■	
BCG(注2)	BCG1回 6月未満	■																					

上の表の ■ 及び ■ は、予防接種法で定められた定期的予防接種の対象者です。病気にかかりやすい時期を考慮して定められた時期(標準的な接種期間)である ■ の期間中にできるだけ接種を受けましょう。なお、麻しん・風しんの予防接種(MRワクチン)は標準的な接種期間はありませんが、麻しんや風しんは幼児期早期にかかってしまうことが多いため、お母さんからの免疫がなくなる生後12か月以降なるべく早期に、第1期の接種を受けましょう。

(注1) 1期DPT(追加接種)の標準的な接種期間は、1期初回接種(3回)終了後12か月に達した時から18か月に達するまでの期間です。

(注2) BCGに係る期間は、地理的条件、交通事情、災害の発生その他の特別な事情によりやむを得ないと認められる市町村に限り、1歳に達するまでの期間に接種することができます。今治市では行政措置として、生後6か月に達するまでの期間に医学的に接種が不適当であると判断された乳児について、医師による医学的判断がなされ1歳に達するまでの時期にBCG接種が行われる場合の費用を負担しています。