

1 回目接種後

心筋炎と評価された報告の頻度 (100万回接種あたり)

年齢 (歳)	ファイザー社 小児用 (5～11歳)		ファイザー社 乳幼児用 (6か月～4歳)		武田社 (ノババックス)	
	男性	女性	男性	女性	男性	女性
0～4	-	-	0	0	-	-
5～11	2.2	0	-	-	-	-
12～14	-	-	-	-	0	0
15～19	-	-	-	-	0	0
20～24	-	-	-	-	0	0
25～29	-	-	-	-	0	0
30～34	-	-	-	-	0	0
35～39	-	-	-	-	0	0
40～44	-	-	-	-	0	0
45～49	-	-	-	-	0	0
50～54	-	-	-	-	0	0
55～59	-	-	-	-	0	0
60～64	-	-	-	-	0	0
65～69	-	-	-	-	0	0
70～74	-	-	-	-	0	0
75～79	-	-	-	-	0	0
80～	-	-	-	-	0	0
総数	2.2	0	0	0	0	0

注) 令和6年1月26日の審議会で評価された数値に基づき作成しています。

1回目接種後

心膜炎と評価された報告の頻度 (100万回接種あたり)

年齢 (歳)	ファイザー社 小児用 (5～11歳)		ファイザー社 乳幼児用 (6か月～4歳)		武田社 (ノババックス)	
	男性	女性	男性	女性	男性	女性
0～4	-	-	0	0	-	-
5～11	2.2	0	-	-	-	-
12～14	-	-	-	-	0	0
15～19	-	-	-	-	0	0
20～24	-	-	-	-	0	0
25～29	-	-	-	-	0	0
30～34	-	-	-	-	0	0
35～39	-	-	-	-	0	0
40～44	-	-	-	-	0	0
45～49	-	-	-	-	0	0
50～54	-	-	-	-	0	0
55～59	-	-	-	-	0	0
60～64	-	-	-	-	0	0
65～69	-	-	-	-	0	0
70～74	-	-	-	-	0	0
75～79	-	-	-	-	0	0
80～	-	-	-	-	0	0
総数	2.2	0	0	0	0	0

注) 令和6年1月26日の審議会で評価された数値に基づき作成しています。

2回目接種後

心筋炎と評価された報告の頻度 (100万回接種あたり)

年齢 (歳)	ファイザー社 小児用 (5～11歳)		ファイザー社 乳幼児用 (6か月～4歳)		武田社 (ノババックス)	
	男性	女性	男性	女性	男性	女性
0～4	-	-	0	0	-	-
5～11	0	0	-	-	-	-
12～14	-	-	-	-	0	0
15～19	-	-	-	-	0	0
20～24	-	-	-	-	0	0
25～29	-	-	-	-	0	0
30～34	-	-	-	-	0	0
35～39	-	-	-	-	0	0
40～44	-	-	-	-	0	0
45～49	-	-	-	-	0	0
50～54	-	-	-	-	0	0
55～59	-	-	-	-	0	0
60～64	-	-	-	-	0	0
65～69	-	-	-	-	0	0
70～74	-	-	-	-	0	0
75～79	-	-	-	-	0	0
80～	-	-	-	-	0	0
総数	0	0	0	0	0	0

注) 令和6年1月26日の審議会で評価された数値に基づき作成しています。

2回目接種後

心膜炎と評価された報告の頻度 (100万回接種あたり)

年齢 (歳)	ファイザー社 小児用 (5～11歳)		ファイザー社 乳幼児用 (6か月～4歳)		武田社 (ノババックス)	
	男性	女性	男性	女性	男性	女性
0～4	-	-	0	0	-	-
5～11	0	0	-	-	-	-
12～14	-	-	-	-	0	0
15～19	-	-	-	-	0	0
20～24	-	-	-	-	0	0
25～29	-	-	-	-	0	0
30～34	-	-	-	-	0	0
35～39	-	-	-	-	0	0
40～44	-	-	-	-	0	0
45～49	-	-	-	-	0	0
50～54	-	-	-	-	0	0
55～59	-	-	-	-	0	0
60～64	-	-	-	-	0	0
65～69	-	-	-	-	0	0
70～74	-	-	-	-	0	0
75～79	-	-	-	-	0	0
80～	-	-	-	-	0	0
総数	0	0	0	0	0	0

注) 令和6年1月26日の審議会で評価された数値に基づき作成しています。

3回目接種後

心筋炎と評価された報告の頻度 (100万回接種あたり)

年齢 (歳)	ファイザー社		ファイザー社 のうち【BA.1】		ファイザー社 のうち【BA.4-5】	
	男性	女性	男性	女性	男性	女性
0～4	-	-	-	-	-	-
5～11	-	-	-	-	-	-
12～14	10.6	2.7	32.4	0	0	0
15～19	7.9	0	0	0	0	0
20～24	5.9	0	0	0	8.0	0
25～29	1.1	1.7	0	0	0	0
30～34	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0
40～44	2.4	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0.4	0	0	0	0
55～59	0.6	0.5	0	0	0	0
60～64	0	0.5	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	0
70～74	0	0.4	0	0	0	0
75～79	0.5	0	0	0	0	0
80～	0.3	0.2	0	0	0	0
総数	1.2	0.3	2.8	0	0.9	0

注) 令和6年1月26日の審議会で評価された数値に基づき作成しています。

3回目接種後

心筋炎と評価された報告の頻度 (100万回接種あたり)

年齢 (歳)	ファイザー社 小児用 (5～11歳)		ファイザー社 小児用 (5～11歳) のうち【BA.4-5】		ファイザー社 乳幼児用 (6か月～4歳)	
	男性	女性	男性	女性	男性	女性
0～4	-	-	-	-	0	0
5～11	0	0	0	0	-	-
12～14	-	-	-	-	-	-
15～19	-	-	-	-	-	-
20～24	-	-	-	-	-	-
25～29	-	-	-	-	-	-
30～34	-	-	-	-	-	-
35～39	-	-	-	-	-	-
40～44	-	-	-	-	-	-
45～49	-	-	-	-	-	-
50～54	-	-	-	-	-	-
55～59	-	-	-	-	-	-
60～64	-	-	-	-	-	-
65～69	-	-	-	-	-	-
70～74	-	-	-	-	-	-
75～79	-	-	-	-	-	-
80～	-	-	-	-	-	-
総数	0	0	0	0	0	0

注) 令和6年1月26日の審議会で評価された数値に基づき作成しています。

3回目接種後

心筋炎と評価された報告の頻度 (100万回接種あたり)

年齢 (歳)	モデルナ社		モデルナ社 のうち【BA.1】		モデルナ社 のうち【BA.4-5】		武田社 (ノババックス)	
	男性	女性	男性	女性	男性	女性	男性	女性
0～4	-	-	-	-	-	-	-	-
5～11	-	-	-	-	-	-	-	-
12～14	0	0	0	0	0	0	0	0
15～19	69.0	15.1	0	0	0	0	0	0
20～24	12.3	0	0	0	0	0	0	0
25～29	3.6	2.5	0	0	0	0	0	0
30～34	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	2.0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	1.7	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0.6	0	0	0	0	0	0	0
60～64	0.6	0	0	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0
80～	0	0	0	0	0	0	0	0
総数	1.3	0.2	0	0	0	0	0	0

注) 令和6年1月26日の審議会で評価された数値に基づき作成しています。

3回目接種後

心膜炎と評価された報告の頻度 (100万回接種あたり)

年齢 (歳)	ファイザー社		ファイザー社 のうち【BA.1】		ファイザー社 のうち【BA.4-5】	
	男性	女性	男性	女性	男性	女性
0～4	-	-	-	-	-	-
5～11	-	-	-	-	-	-
12～14	5.3	2.7	0	0	0	0
15～19	3.6	0	0	0	0	0
20～24	0	2.9	0	0	0	0
25～29	0	0	0	0	0	0
30～34	0	0	0	0	0	0
35～39	0.9	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0.5	0	0	0	0
50～54	0	0.4	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0.5	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0
80～	1.0	0	0	0	0	0
総数	0.5	0.2	0	0	0	0

注) 令和6年1月26日の審議会で評価された数値に基づき作成しています。

3回目接種後

心膜炎と評価された報告の頻度 (100万回接種あたり)

年齢 (歳)	ファイザー社 小児用 (5～11歳)		ファイザー社 小児用 (5～11歳) のうち【BA.4-5】		ファイザー社 乳幼児用 (6か月～4歳)	
	男性	女性	男性	女性	男性	女性
0～4	-	-	-	-	0	0
5～11	0	0	0	0	-	-
12～14	-	-	-	-	-	-
15～19	-	-	-	-	-	-
20～24	-	-	-	-	-	-
25～29	-	-	-	-	-	-
30～34	-	-	-	-	-	-
35～39	-	-	-	-	-	-
40～44	-	-	-	-	-	-
45～49	-	-	-	-	-	-
50～54	-	-	-	-	-	-
55～59	-	-	-	-	-	-
60～64	-	-	-	-	-	-
65～69	-	-	-	-	-	-
70～74	-	-	-	-	-	-
75～79	-	-	-	-	-	-
80～	-	-	-	-	-	-
総数	0	0	0	0	0	0

注) 令和6年1月26日の審議会で評価された数値に基づき作成しています。

3回目接種後

心膜炎と評価された報告の頻度 (100万回接種あたり)

年齢 (歳)	モデルナ社		モデルナ社 のうち【BA.1】		モデルナ社 のうち【BA.4-5】		武田社 (ノババックス)	
	男性	女性	男性	女性	男性	女性	男性	女性
0～4	-	-	-	-	-	-	-	-
5～11	-	-	-	-	-	-	-	-
12～14	0	0	0	0	0	0	0	0
15～19	69.0	0	0	0	0	0	0	0
20～24	1.4	0	0	0	0	0	0	0
25～29	3.6	0	0	0	0	0	0	0
30～34	0	1.3	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	1.7	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0.8	0	0	0	0	0	0
50～54	0.6	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0
80～	0	0	0	0	0	0	0	0
総数	0.6	0.1	0	0	0	0	0	0

注) 令和6年1月26日の審議会で評価された数値に基づき作成しています。

4 回目接種後

心筋炎と評価された報告の頻度 (100万回接種あたり)

年齢 (歳)	ファイザー社		ファイザー社 のうち【BA.1】		ファイザー社 のうち【BA.4-5】		ファイザー社 小児用（5～11歳）		ファイザー社 小児用（5～11歳） のうち【BA.4-5】	
	男性	女性	男性	女性	男性	女性	男性	女性	男性	女性
0～4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5～11	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
12～14	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
15～19	0	1.7	0	0	0	2.0	-	-	-	-
20～24	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
25～29	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
30～34	0	1.6	0	0	0	2.5	-	-	-	-
35～39	1.5	0	0	0	2.3	0	-	-	-	-
40～44	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
45～49	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
50～54	0.6	0	0	0	0	0	-	-	-	-
55～59	0	0.5	0	0	0	1.0	-	-	-	-
60～64	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
65～69	0	0.5	0	0	0	0	-	-	-	-
70～74	0	0.4	0	0	0	0	-	-	-	-
75～79	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
80～	0.7	0.2	0	4.0	0	0	-	-	-	-
総数	0.2	0.3	0	0.3	0.2	0.4	0	0	0	0

注) 令和6年1月26日の審議会で評価された数値に基づき作成しています。

4 回目接種後

心筋炎と評価された報告の頻度 (100万回接種あたり)

年齢 (歳)	モデルナ社		モデルナ社 のうち【BA.1】		モデルナ社 のうち【BA.4-5】		武田社 (ノババックス)	
	男性	女性	男性	女性	男性	女性	男性	女性
0～4	-	-	-	-	-	-	-	-
5～11	-	-	-	-	-	-	-	-
12～14	0	0	0	0	0	0	0	0
15～19	0	0	0	0	0	0	0	0
20～24	0	0	0	0	0	0	0	0
25～29	0	0	0	0	0	0	0	0
30～34	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	4.6	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	0	1.1	0	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0
80～	0	0	0	0	0	0	0	0
総数	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0

注) 令和6年1月26日の審議会で評価された数値に基づき作成しています。

4 回目接種後

心膜炎と評価された報告の頻度 (100万回接種あたり)

年齢 (歳)	ファイザー社		ファイザー社 のうち【BA.1】		ファイザー社 のうち【BA.4-5】		ファイザー社 小児用（5～11歳）		ファイザー社 小児用（5～11歳） のうち【BA.4-5】	
	男性	女性	男性	女性	男性	女性	男性	女性	男性	女性
0～4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5～11	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
12～14	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
15～19	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
20～24	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
25～29	0	1.8	0	0	0	0	-	-	-	-
30～34	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
35～39	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
40～44	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
45～49	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
50～54	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
55～59	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
60～64	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
65～69	0	0.5	0	0	0	0	-	-	-	-
70～74	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
75～79	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
80～	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
総数	0	0.1	0	0	0	0.1	0	0	0	0

注) 令和6年1月26日の審議会で評価された数値に基づき作成しています。

4回目接種後

心膜炎と評価された報告の頻度 (100万回接種あたり)

年齢 (歳)	モデルナ社		モデルナ社 のうち【BA.1】		モデルナ社 のうち【BA.4-5】		武田社 (ノババックス)	
	男性	女性	男性	女性	男性	女性	男性	女性
0～4	-	-	-	-	-	-	-	-
5～11	-	-	-	-	-	-	-	-
12～14	0	0	0	0	0	0	0	0
15～19	0	0	0	0	0	0	0	0
20～24	0	0	0	0	0	0	0	0
25～29	0	0	0	0	0	0	0	0
30～34	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	0	0	0
70～74	0.8	0	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0
80～	0	0	0	0	0	0	0	0
総数	0.1	0	0	0	0	0	0	0

注) 令和6年1月26日の審議会で評価された数値に基づき作成しています。

5回目接種後

心筋炎と評価された報告の頻度
(100万回接種あたり)

年齢 (歳)	ファイザー社		ファイザー社 のうち【BA.1】		ファイザー社 のうち【BA.4-5】		ファイザー社 小児用（5～11歳）		ファイザー社 小児用（5～11歳） のうち【BA.4-5】	
	男性	女性	男性	女性	男性	女性	男性	女性	男性	女性
0～4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5～11	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
12～14	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
15～19	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
20～24	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
25～29	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
30～34	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
35～39	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
40～44	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
45～49	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
50～54	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
55～59	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
60～64	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
65～69	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
70～74	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
75～79	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
80～	0.6	0	0	0	0.6	0	-	-	-	-
総数	0.1	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0

注) 令和6年1月26日の審議会で評価された数値に基づき作成しています。

5回目接種後

心筋炎と評価された報告の頻度 (100万回接種あたり)

年齢 (歳)	モデルナ社		モデルナ社 のうち【BA.1】		モデルナ社 のうち【BA.4-5】		武田社 (ノババックス)	
	男性	女性	男性	女性	男性	女性	男性	女性
0～4	-	-	-	-	-	-	-	-
5～11	-	-	-	-	-	-	-	-
12～14	0	0	0	0	0	0	0	0
15～19	0	0	0	0	0	0	0	0
20～24	0	0	0	0	0	0	0	0
25～29	0	0	0	0	0	0	0	0
30～34	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0
80～	0	0	0	0	0	0	0	0
総数	0	0	0	0	0	0	0	0

注) 令和6年1月26日の審議会で評価された数値に基づき作成しています。

5回目接種後

心膜炎と評価された報告の頻度
(100万回接種あたり)

年齢 (歳)	ファイザー社		ファイザー社 のうち【BA.1】		ファイザー社 のうち【BA.4-5】		ファイザー社 小児用（5～11歳）		ファイザー社 小児用（5～11歳） のうち【BA.4-5】	
	男性	女性	男性	女性	男性	女性	男性	女性	男性	女性
0～4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5～11	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
12～14	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
15～19	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
20～24	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
25～29	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
30～34	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
35～39	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
40～44	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
45～49	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
50～54	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
55～59	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
60～64	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
65～69	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
70～74	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
75～79	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
80～	0.3	0	0	0	0.3	0	-	-	-	-
総数	0.1	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0

注) 令和6年1月26日の審議会で評価された数値に基づき作成しています。

5回目接種後

心膜炎と評価された報告の頻度 (100万回接種あたり)

年齢 (歳)	モデルナ社		モデルナ社 のうち【BA.1】		モデルナ社 のうち【BA.4-5】		武田社 (ノババックス)	
	男性	女性	男性	女性	男性	女性	男性	女性
0～4	-	-	-	-	-	-	-	-
5～11	-	-	-	-	-	-	-	-
12～14	0	0	0	0	0	0	0	0
15～19	0	0	0	0	0	0	0	0
20～24	0	0	0	0	0	0	0	0
25～29	0	0	0	0	0	0	0	0
30～34	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0
80～	0	0	0	0	0	0	0	0
総数	0	0	0	0	0	0	0	0

注) 令和6年1月26日の審議会で評価された数値に基づき作成しています。

6回目接種後

心筋炎と評価された報告の頻度 (100万回接種あたり)

年齢 (歳)	ファイザー社		ファイザー社 のうち【BA.1】		ファイザー社 のうち【BA.4-5】	
	男性	女性	男性	女性	男性	女性
0～4	-	-	-	-	-	-
5～11	-	-	-	-	-	-
12～14	0	0	0	0	0	0
15～19	0	0	0	0	0	0
20～24	0	0	0	0	0	0
25～29	0	0	0	0	0	0
30～34	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0
80～	0	0	0	0	0	0
総数	0	0	0	0	0	0

注) 令和6年1月26日の審議会で評価された数値に基づき作成しています。

6回目接種後

心筋炎と評価された報告の頻度 (100万回接種あたり)

年齢 (歳)	モデルナ社		モデルナ社 のうち【BA.1】		モデルナ社 のうち【BA.4-5】		武田社 (ノババックス)	
	男性	女性	男性	女性	男性	女性	男性	女性
0～4	-	-	-	-	-	-	-	-
5～11	-	-	-	-	-	-	-	-
12～14	0	0	0	0	0	0	0	0
15～19	0	0	0	0	0	0	0	0
20～24	0	0	0	0	0	0	0	0
25～29	0	0	0	0	0	0	0	0
30～34	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0
80～	0	0	0	0	0	0	0	0
総数	0	0	0	0	0	0	0	0

注) 令和6年1月26日の審議会で評価された数値に基づき作成しています。

6回目接種後

心膜炎と評価された報告の頻度 (100万回接種あたり)

年齢 (歳)	ファイザー社		ファイザー社 のうち【BA.1】		ファイザー社 のうち【BA.4-5】	
	男性	女性	男性	女性	男性	女性
0～4	-	-	-	-	-	-
5～11	-	-	-	-	-	-
12～14	0	0	0	0	0	0
15～19	0	0	0	0	0	0
20～24	0	0	0	0	0	0
25～29	0	0	0	0	0	0
30～34	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0
75～79	0.7	0	2.4	0	0	0
80～	0	0	0	0	0	0
総数	0.2	0	0.5	0	0	0

注) 令和6年1月26日の審議会で評価された数値に基づき作成しています。

6回目接種後

心膜炎と評価された報告の頻度 (100万回接種あたり)

年齢 (歳)	モデルナ社		モデルナ社 のうち【BA.1】		モデルナ社 のうち【BA.4-5】		武田社 (ノババックス)	
	男性	女性	男性	女性	男性	女性	男性	女性
0～4	-	-	-	-	-	-	-	-
5～11	-	-	-	-	-	-	-	-
12～14	0	0	0	0	0	0	0	0
15～19	0	0	0	0	0	0	0	0
20～24	0	0	0	0	0	0	0	0
25～29	0	0	0	0	0	0	0	0
30～34	0	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0
40～44	0	0	0	0	0	0	0	0
45～49	0	0	0	0	0	0	0	0
50～54	0	0	0	0	0	0	0	0
55～59	0	0	0	0	0	0	0	0
60～64	0	0	0	0	0	0	0	0
65～69	0	0	0	0	0	0	0	0
70～74	0	0	0	0	0	0	0	0
75～79	0	0	0	0	0	0	0	0
80～	0	0	0	0	0	0	0	0
総数	0	0	0	0	0	0	0	0

注) 令和6年1月26日の審議会で評価された数値に基づき作成しています。

7回目接種後

心筋炎と評価された報告の頻度 (100万回接種あたり)

年齢 (歳)	武田社 (ノババックス)	
	男性	女性
0～4	-	-
5～11	-	-
12～14	0	0
15～19	0	0
20～24	0	0
25～29	0	0
30～34	0	0
35～39	0	0
40～44	0	0
45～49	0	0
50～54	0	0
55～59	0	0
60～64	0	0
65～69	0	0
70～74	0	0
75～79	0	0
80～	0	0
総数	0	0

心膜炎と評価された報告の頻度 (100万回接種あたり)

年齢 (歳)	武田社 (ノババックス)	
	男性	女性
0～4	-	-
5～11	-	-
12～14	0	0
15～19	0	0
20～24	0	0
25～29	0	0
30～34	0	0
35～39	0	0
40～44	0	0
45～49	0	0
50～54	0	0
55～59	0	0
60～64	0	0
65～69	0	0
70～74	0	0
75～79	0	0
80～	0	0
総数	0	0

注) 令和6年1月26日の審議会で評価された数値に基づき作成しています。